Vacuna	***CoronaVac (Sinovac)***	***(AstraZeneca/Oxford)***	***(Pfizer/BioNTech)***	***mRNA 1273 (Moderna)***
Plataforma utilizada	Virus inactivado	Vector viral	ARN mensajero	ARN mensajero
Protección conferida en estudios clínicos	50,4%	Entre 63,0% y 78,0% (aumenta con intervalo más largo entre dosis).	95,0%	94,1%
Dosis e intervalos	2 dosis; intervalo de 14 días.	2 dosis; intervalo de 28 a 84 días entre la primera y la segunda.	2 dosis; Intervalo de 21 días entre la primera y la segunda.	2 dosis; intervalo de 28 días entre la primera y la segunda.
Efectos secundarios de especial interés	No se especifican.	Se han descrito tres casos de parálisis facial y dos casos de mielitis transversa.	Se han descrito cuatro casos de parálisis facial y 64 casos de adenopatías.	Se han descrito 3 casos de parálisis facial y 173 casos de adenopatías.
Recomendaciones para personas inmunodeprimidas, incluidas las personas con virus de inmunodeficiencia humana	Alerta sobre la posibilidad de que la respuesta inmunitaria a la vacunación sea insuficiente.	No hay ninguna contraindicación para este grupo, pero existe la posibilidad de que la respuesta inmune a la vacunación sea insuficiente.	No hay ninguna contraindicación para este grupo, pero existe la posibilidad de que la respuesta inmune a la vacunación sea insuficiente.	No hay ninguna contraindicación para este grupo, pero existe la posibilidad de que la respuesta inmune a la vacunación sea insuficiente.
Recomendaciones para pacientes con enfermedades autoinmunes	No existen recomendaciones específicas.	No existen recomendaciones específicas. No está contraindicada.	No existen recomendaciones específicas. No está contraindicada.	No existen recomendaciones específicas. No está contraindicada.
Recomendaciones para personas con antecedentes de síndrome de Guillain-Barré	No hay recomendaciones específicas.	No hay recomendaciones específicas.	No hay informes de casos de síndrome de Guillain-Barré hasta la fecha.	No hay informes de casos de síndrome de Guillain-Barré hasta la fecha.

Vacuna	***AD26.COV2.S (Janssen-Cilag/Johnson & Johnson)***	***Sputinik V (Gamaleya Research Institute)***	***Covaxin (Bharat Biotech)***	***Ad5-nCoV (CanSino)***	***NVX-CoV2373 (Novavax)***
Plataforma utilizada	Vector viral	Vector viral	Virus inactivado	Vector viral	Subunidad proteica
Protección conferida en estudios clínicos	66,0%	91,6%	73,0% a 81,0%, dos participantes produjeron anticuerpos (aún sin datos finales de fase 3)	65,7% (aún sin datos finales de fase 3)	89,3%
Dosis e intervalos	1 o 2 dosis; en el segundo caso con intervalo de 56 días entre una y otra.	2 dosis; intervalo de 21 días entre la primera y la segunda.	2 dosis; intervalo de 14 días entre la primera y la segunda.	1 dosis.	2 dosis; intervalo de 21 días entre la primera y la segunda.
Efectos secundarios	Reacciones en el sitio de inyección, fatiga, dolor de cabeza, mialgias y fiebre.	Síntomas similares al resfriado, reacciones locales, dolor de cabeza y astenia.	Reacciones en el sitio de inyección, dolor de cabeza, fatiga y fiebre.	Reacciones en el sitio de inyección, dolor de cabeza, fatiga y fiebre.	Reacciones en el sitio de inyección, dolor de cabeza, malestar general, artralgias y fiebre.
Para quién está recomendada	Mayores de 18 años.	Mayores de 18 años.	La fase 2 se llevó a cabo en > 12 años y < 65 años.	Mayores de 18 años.	Mayores de 18 años.
Recomendaciones para mujeres embarazadas y lactando	No disponible.	Al 28 de enero de 2021 no hay estudios de eficacia y seguridad relacionados a la administración de la vacuna en estas poblaciones.	No disponible.	No disponible.	No disponible.